


DAÑOS DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES POR EDAD Y ETAPA

GLOBAL
CLIMATE & HEALTH
ALLIANCE

Infancia

- Riesgos de **leucemia, asma y daño pulmonar duradero**.
- Puede perjudicar el **desarrollo cerebral**, reducir el **coeficiente intelectual** y afectar la **salud mental**.
- Los niños más pobres y marginados se enfrentan a una **mayor exposición** y a **menos protección**.



Prenatal

- Durante el embarazo, los daños causados por los combustibles fósiles aumentan el riesgo de **aborto espontáneo, parto prematuro, bajo peso al nacer** y **defectos congénitos**.
- La exposición al **carbón, el petróleo, el gas, los gases de escape del tráfico o el benceno** puede perjudicar el **desarrollo cerebral, cardíaco y pulmonar** del feto, y puede **aumentar el riesgo de cáncer infantil**.
- Las embarazadas presentan **mayores tasas de complicaciones**, como **preeclampsia, diabetes gestacional** y **problemas de fertilidad**.



Adolescencia

- Etapa clave del desarrollo donde la **exposición a contaminantes de combustibles fósiles** puede tener efectos **duraderos en la salud**.
- La exposición a HAP se **relaciona con una pubertad tardía**; los riesgos generales probablemente se **subestiman** debido a la limitada investigación específica para adolescentes.



Edad adulta

Además de los daños causados por los combustibles fósiles ya mencionados, los adultos tienden a desempeñar los roles más peligrosos y de mayor exposición en la industria de los combustibles fósiles, **con consecuencias a largo plazo para la salud**.



Ancianos

La contaminación por combustibles fósiles **agrava las enfermedades crónicas, aumenta el riesgo de demencia y Parkinson**, y contribuye a la **muerte prematura**.

